

全国卫生专业技术资格考试护理学考试(师)

考前必背 100 考点

1.肌力程度分为六级:

0 级:完全瘫痪,肌力完全丧失

1 级:可见肌肉轻微收缩,但无肢体运动

2 级:肢体可水平移动位置,但不能抬起

3 级:肢体能抬离床面,但不能对抗阻力

4 级:能做对抗阻力的运动,但肌力减弱

5 级:肌力正常

2.肢体活动能力:分为 5 度

0 度:完全独立,可自由活动

1 度:需要使用设备或器械(如拐杖、轮椅)

2 度:需要他人的帮助、监护和教育

3 度:既需要他人的帮助,也需要设备或器械

4 度:完全不能独立,不能参加活动

3.热水袋水温:成人为 60~70 ℃,昏迷、老人、婴幼儿、感觉迟钝、循环不良等患者,水温应低于 50 ℃。

4.烤灯方法为保持灯距 30~50 cm,温热适宜,治疗时间为 20~30 分钟。

5.热水坐浴:能达到消炎、消肿、止疼的目的,用于会阴部、肛门疾病及手术后。水温为 40~45 ℃,时间为 15~20 分钟。女性患者经期、妊娠后期、产后两周内、阴道流血和盆腔急性炎症不宜坐浴,

以免引起感染。

6.直径小于 2 mm 称为瞳孔缩小,小于 1 mm 为针尖样瞳孔。双侧瞳孔缩小,常见于有机磷农药、氯丙嗪、吗啡等药物中毒;单侧瞳孔缩小常提示同侧小脑幕裂孔疝早期。

7.瞳孔散大:直径大于 5 mm 称为瞳孔散大。双侧瞳孔散大,常见于颅内压增高、颅脑损伤、颠茄类药物中毒及濒死状态;一侧瞳孔扩大、固定,常提示同侧颅内病变(如颅内血肿、脑肿瘤等)所致的小脑幕裂孔疝的发生。

8.氧疗不良反应

氧中毒表现为胸骨下不适、疼痛、灼热感,继而出现呼吸增快、恶心、呕吐、烦躁、断续的干咳。预防措施是避免长时间、高浓度氧疗及经常做血气分析,动态观察氧疗的治疗效果。

肺不张:表现为烦躁,呼吸、心率增快,血压上升,继而出现呼吸困难、发绀、昏迷。预防措施是鼓励患者做深呼吸,多咳嗽和经常改变卧位、姿势,防止分泌物阻塞呼吸道分泌物干燥。

9.急性病容:面颊潮红、烦躁不安、呼吸急促、痛苦呻吟等。

11.慢性病容:面容憔悴,面色苍白或灰暗,精神萎靡、瘦弱无力。

12.二尖瓣面容:面容晦暗,口唇微绀,面部两颧绀红。

13.甲亢面容:面容惊愕、眼裂增宽、眼球突出、目光炯炯有神、情绪激动易变。

14.满月面容:面容圆如满月、皮肤发红、常伴痤疮和毳毛。

15.肢端肥大症面容:头颅增大、面部变长、眉弓及两侧颧部隆起、下颌增大前突、耳鼻增大、唇舌肥厚。

16.病危面容:面容枯槁,面色灰白或发绀,表情淡漠,眼眶凹陷,目光无神,皮肤湿冷,甚至大汗淋漓。

17.颜色新鲜正常尿液为淡黄色透明液体;服用维生素 B₂ 或多吃胡萝卜者尿色加深。

18.胆红素尿:尿色呈深黄色,多见于阻塞性黄疸及肝细胞性黄疸。

19.血红蛋白尿:尿液呈酱油色,见于急性溶血、恶性疟疾和血型不合的输血反应等。

20.乳糜尿:为白色乳样尿液,见于晚期血丝虫病。

21.尿液氨臭味:为慢性膀胱炎及尿潴留的表现。糖尿病酮症病人,尿液呈烂苹果样气味。膀胱直肠痿病人尿液带粪臭味。

22.酸碱度:尿液一般为弱酸性,进素食者尿液呈中性或弱碱性,进食肉类食物时尿液呈酸性。在酸中毒、发热或服用氯化铵等药物时,尿液可呈较强的酸性,服用碳酸氢钠类药物或碱中毒时,尿液呈碱性。

23.三凹征:见于喉水肿、痉挛,与气管异物、气管受压或肿瘤等引起的上呼吸道狭窄梗阻有关。

24.呼气性呼吸困难特点:呼气费力,呼气时间延长伴有广泛哮鸣音。

25.左心衰竭主要表现为肺循环淤血。

26.心功能分级

心功能 I 级表现为体力活动不受限制;

心功能 II 级表现为体力活动轻度受限制,日常活动可引起气急、心悸;

心功能Ⅲ级表现为体力活动明显受限制,稍事活动即引起气急、心悸,有轻度脏器淤血体征;

心功能Ⅳ级表现为体力活动重度受限制,休息状态下也气急、心悸,有重度脏器淤血体征。

27.洋地黄类药物:常用制剂中效:地高辛,为口服制剂;速效:毛花苷丙,为静脉注射制剂。

28.日射病:由于烈日暴晒或强烈热辐射作用头部,引起脑组织充血、水肿,出现剧烈头痛、头晕、眼花、耳鸣、呕吐、烦躁不安,严重时可发生昏迷、惊厥。

29.疖主要致病菌多为金黄色葡萄球菌,发生在面部“危险三角区”的疖,如被挤压或处理不当时可引起化脓性海绵状静脉窦炎。

31.痈主要致病菌为金黄色葡萄球菌,界限不清,表面有几个突出点或脓点,疼痛较轻及时手术切开排脓,清除坏死组织。

32.急性蜂窝织炎致病菌多为溶血性链球菌,口底、颌下、颈部等处的急性蜂窝织炎,可发生喉头水肿而压迫气管,引起呼吸困难甚至窒息应尽早切开减压,以防喉头水肿、窒息。

33.膀胱结石:主要是膀胱刺激症状,如尿频、尿急和排尿终末疼痛。典型症状为排尿突然中断,并感觉疼痛,常放射至阴茎头部和远端尿道,变换体位又能继续排尿。常有终末血尿,合并感染可出现脓尿。

34.先兆流产:少量阴道流血伴有轻微下腹痛。子宫大小与停经周数相符,宫颈口未开,胎膜未破,妊娠产物未排出。卧床休息;禁止性生活;减少刺激;对于黄体功能不足的孕妇,每日肌肉注射黄体酮保胎。

35.难免流产:子宫大小与停经周数相符或略小,子宫颈口已扩张,但组织尚未排出。尽早使胚胎及胎盘组织完全排出。

36.不全流产:子宫小于停经周数,子宫颈口已扩张,部分妊娠产物已排出于阴道内,而部分仍留在子宫腔内,应行吸宫术或钳刮术。

37.完全流产:妊娠产物已完全排出如无感染征象,一般不需特殊处理。

38.稽留流产:听诊不能闻及胎心音处理前应做凝血功能检查。

39.第一产程(宫颈扩张期)从有规律宫缩开始至宫口开全。初产妇约需 11~12 小时,经产妇 6~8 小时。

40.第二产程(胎儿娩出期)从宫颈口开全到胎儿娩出。初产妇需 1~2 小时,经产妇约需几分钟至 1 小时。

41.第三产程(胎盘娩出期)从胎儿娩出到胎盘娩出。约需 5~15 分钟,一般不超过半小时。

42.新生儿窒息:轻度(青紫)窒息(Apgar 评分 4~7 分)重度(苍白)窒息(Apgar 评分 0~3 分)

43.妊娠期高血压:BP \geq 140/90 mmHg 尿蛋白(-)。

44.子痫前期(轻度):BP \geq 140/90 mmHg 尿蛋白 \geq 0.3 g/24 h。

45.子痫前期(重度):BP \geq 160/110 mmHg 尿蛋白 \geq 2.0 g/24 h。

46.法洛四联症是一种常见的青紫型先天性心脏病。主要临床特征为肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨和右心室肥厚。其中以肺动脉狭窄为主要畸形。

47.白色泡沫或黏液痰转为黄色——细菌性感染。

48.草绿色痰——铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)感染。

49.红棕色胶冻状痰——肺炎克雷伯杆菌感染。

50.白色泡沫样痰——支气管扩张症。

51.依据痰的性状鉴别:红褐色或巧克力色痰考虑阿米巴肺脓肿;果酱样痰多为肺吸虫病;粉红色泡沫样痰提示急性左心衰竭;咳出的痰液有恶臭气味提示厌氧菌感染;灰黑色痰多与大气污染或肺尘埃沉着症有关。

52.临床上咯血量分为痰中带血、少量咯血 $<100\text{ mL/d}$ 、中等量咯血 $100\sim 500\text{ mL/d}$ 、大量咯血 $>500\text{ mL/d}$ 或一次 $>300\text{ mL}$ 。

53.吸气性呼吸困难多见于喉水肿、痉挛,与气管异物、气管受压或肿瘤等引起的上呼吸道狭窄梗阻有关。

54.呼气性呼吸困难多见于支气管哮喘、喘息型慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿等。

55.混合性呼吸困难多见于重症肺炎、重症肺结核、大量胸腔积液、气胸等。

56.原发性支气管肺癌临床表现之一上腔静脉压迫综合征:头面部、颈部和上肢水肿,前胸部淤血和静脉曲张,可有头痛、头昏或眩晕,是由癌肿侵犯纵隔,压迫上腔静脉时,上腔静脉回流受阻引起。

57.心源性呼吸困难护理一般给予中等流量 $2\sim 4\text{ L/min}$ 、中等浓度 $29\%\sim 37\%$ 氧气吸入。急性肺水肿病人应吸入经 $30\%\sim 50\%$ 乙醇湿化的氧气。

58.窦性心动过速:成人窦性心律在 $100\sim 150$ 次/分,偶有高达 200 次/分。房颤心室率小于 150 次/分。

59.心绞痛持续时间多在 $3\sim 5$ 分钟内,一般不超过 15 分钟。

60.心梗监测尿量 $>30\text{ mL/h}$,神志转清,提示休克好转。观察疼痛性质,遵医嘱及时给予镇痛药如哌替啶、吗啡等。

61.上消化道出血量为 5 mL 左右,即可使粪便隐血试验呈阳性,出血量达 $50\sim 70\text{ mL}$ 时可产生黑便。当出血量 $>500\text{ mL}$ 时,出现循环血量不足甚至循环衰竭症状,实验室检查会有血红蛋白下降。

62.胃溃疡疼痛表现:①烧灼或痉挛感;②部位在剑突下正中或稍偏左;③发作为进食后 $30\sim 60$ 分钟,疼痛较少发生于夜晚;④持续 $1\sim 2$ 小时;⑤规律为进食—疼痛—缓解。

63.十二指肠溃疡表现:①钝痛、灼痛、胀痛或剧痛,或仅有饥饿样不适感;②部位在上腹正中或稍偏右;③发作为进餐后 $1\sim 3$ 小时,也常发生在午夜至凌晨;④持续为饭后 $2\sim 4$ 小时,到下次进餐后为止;⑤规律为疼痛—进食—缓解。

64.柳氮磺吡啶,简称SASP,一般作为溃疡性结肠炎的首选药物,适用于轻、中型或重型。

65.肾上腺糖皮质激素适用于溃疡性结肠炎爆发型或重型病人。

66.肝硬化患者内分泌功能异常主要表现为肝对雌激素灭活能力减退,导致雌激素在体内增多,抑制脑腺垂体功能,促性腺激素分泌减少,男性患者可有性欲减退、睾丸萎缩、乳房发育等;女性有月经失调、闭经等。并可见肝掌和蜘蛛痣。

67.肝硬化门静脉高压症的三大表现:脾大、侧支循环的建立和开放、腹水。

68.肝硬化失代偿期门脉高压,脾因门脉压力增高肿大,常伴有

脾功能亢进,从而加速血细胞破坏,并抑制血细胞的成熟,表现为白细胞、血小板和红细胞计数减少。

69.肝硬化失代偿期门脉高压,可导致侧支循环建立和开发,其中可致食管下段和胃底静脉曲张,此类患者进食粗糙坚硬食品导致机械损伤后,可出现呕血等上消化道大出血的症状。

肝硬化患者若在短期内出现肝增大,且表面发现肿块,持续肝疼痛或腹水呈血性,应想到并发原发性肝癌的可能,应进一步检查。

70.上消化道出血是肝性脑病的常见诱因。肝硬化患者上消化道出血后,血液淤积在胃肠道内,经细菌分解产生大量的氨,后者可经肠壁扩散入血引起血氨升高,从而促发肝性脑病。

71.上消化道出血是肝硬化最常见的并发症。

72.肝性脑病是晚期肝硬化最严重的并发症,亦是常见死亡原因。

73.肝肾综合征,也称功能性肾衰竭,表现为少尿或无尿、氮质血症、稀释性低钠血症。

74.肝肺综合征:为严重的肝病、肺血管扩张和低氧血症的三联征。

75.原发性肝癌的治疗方法有手术治疗、化学治疗和放射治疗等。其中手术切除仍是目前根治本病的最好方法,适合手术者应及早手术切除。

76.补充支链氨基酸可纠正由于支链氨基酸减少和芳香族氨基酸增多导致的氨基酸代谢不平衡,从而抑制大脑中由于增多的色氨酸衍生的假神经递质 5-羟色胺的形成,从而治疗肝性脑病。

77.肝硬化患者使用稀醋溶液灌肠,可酸化肠道,减少肠道氨的吸收,预防肝性脑病。

78.甲胎蛋白(AFP)是肝癌早期诊断的重要方法之一。

79.细胞外液中最重要的是血浆,占体重的5%。

80.等渗性脱水是外科最常见的脱水,缺水、缺钠同时存在,大量补液时首选平衡盐溶液,可避免高氯性酸中毒。

81.中心静脉置管行肠外营养支持过程中,若出现不明原因的高热,应考虑导管脓毒症。

82.只要肠道有功能,最好尽量使用肠内营养支持。

83.急性胰腺炎患者血清淀粉酶在发病开始后2~12小时开始升高。

84.水肿型急性胰腺炎多见,一般病情较轻,不出现全身和局部并发症;出血坏死型则病情较重,易并发休克、腹膜炎等,死亡率高。

85.禁食及胃肠减压可减少胃酸与食物刺激胰液分泌,减轻腹痛与腹胀,为急性胰腺炎首选护理措施。

86.急性胰腺炎经治疗后,腹痛呕吐基本缓解,可给少量糖类(碳水化合物类)流质,以后逐渐恢复饮食,但忌油脂。

87.出血坏死型者可出现低钙血症,且低血钙程度与临床严重程度平行,常是重症与预后不良的征兆。血清淀粉酶的高低不一定反映病情轻重。

88.在我国引起急性胰腺炎的最常见病因为胆道疾病(如胆结石、胆道炎症和胆道蛔虫等)。

89.胎头的4条主要径线,其中双顶径平均值为9.3 cm,枕下前

囱径约为 9.5 cm,枕颈径约为 13.3 cm,枕额径约为 11.3 cm。

90.腹压是指腹肌、膈肌收缩力,是第二产程的重要辅助力量。

91.胎盘附着部位内膜完全修复需要 6 周,除胎盘剥离面外的宫腔表面内膜修复约需 3 周。

92.不哺乳产妇一般在产后 6~10 周月经复潮。哺乳期妇女月经复潮延迟,一般在产后 4~6 个月恢复排卵。

93.流产的原因很多,早期流产中染色体异常是主要原因。

94.妊娠期高血压疾病终止妊娠指征是:先兆子痫孕妇经积极治疗 24~48 小时无明显好转;先兆子痫孕妇,胎龄超过 36 周,治疗好转;先兆子痫孕妇,胎龄不足 36 周,胎盘功能减退,胎儿已成熟;子痫控制后 2 小时的孕妇。

95.前置胎盘是指妊娠 28 周后胎盘附着于子宫下段、甚至胎盘下缘达到或覆盖宫颈内口处,其位置低于胎儿先露部,为防止前置胎盘自其附着处剥离出血,所以禁止肛查。

96.妊娠合并心脏病者应在胎儿娩出后,腹部立即放置沙袋,持续 24 小时,防止腹压骤降,诱发心衰。

97.产后 7 天内的乳汁称初乳。量少,微黄,含脂肪少而蛋白质较多,且主要为免疫球蛋白(抗体),此外富含多种营养素,如维生素 A、牛磺酸、矿物质等。

98.ABO 血型不合引起的新生儿溶血症,母亲多为 O 型,新生儿为 A 型或 B 型多见。

99.一般 3~6 个月佝偻病患儿可见颅骨软化,6 个月以后小儿可见手镯征,7~8 个月患儿可见方颅,1 岁左右患儿可见肋骨串珠和肋膈沟。

100. 由于宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤, 所以防癌宣传尤为重要。提倡晚婚、晚育、少育, 做到“三早”即早诊断、早发现、早治疗。30 岁以上已婚妇女, 到门诊就诊时应常规宫颈刮片检查, 一般妇女每 1~2 年普查一次。

全国卫生专业技术资格考试护理学考试(师)

考前必背 50 考题

1. 患者女, 54 岁。近 4 日以来持续出现胸前区疼痛。就诊过程中患者突然发生意识不清, 面色苍白, 血压测不出。医护人员立即为其进行了人工呼吸、胸外心脏按压, 电击除颤等急救措施, 经过 5 个周期的 CPR, 护士对患者进行评估的重点内容是

- A. 表情
- B. 尿量
- C. 中心静脉压
- D. 大动脉搏动
- E. 肌张力

【答案】D

2. 病人面容晦暗, 口唇微绀, 两面颊呈淤血性发红, 考虑

- A. 急性面容
- B. 甲状腺功能亢进面容
- C. 满月面容
- D. 高血压面容
- E. 二尖瓣面容

【答案】E

3. 患者男, 58 岁。尿液呈烂苹果味, 提示该患者可能是

- A. 肝性脑病
- B. 泌尿系感染
- C. 敌敌畏中毒
- D. 阻塞性黄疸
- E. 糖尿病酮症酸中毒

【答案】E

4. 患者男, 32 岁。患慢性痢疾, 遵医嘱行保留灌肠, 为提高治疗效果, 适宜采取的体位是

- A. 右侧卧位
- B. 俯卧位

C.左侧卧位 D.膝胸卧位

E.截石位

【答案】C

5.患者男,40岁。胃、十二指肠溃疡出血,经对症治疗后出血停止,大便潜血阳性,出血期间,患者大便呈

A.鲜红色 B.暗红色

C.柏油色 D.果酱色

E.黄褐色

【答案】C

6.患者出现洋地黄毒性反应,首要的处理措施是

A.补液,稀释体内药物 B.电击除颤

C.利多卡因,纠正心律失常 D.利尿,促进排泄

E.停用洋地黄药物

【答案】E

7.急性胰腺炎的首发症状是

A.恶心 B.发热

C.腹痛 D.休克

E.呕吐

【答案】C

8.中毒患者皮肤黏膜表现为“樱桃红色”,提示

A.有机磷中毒 B.一氧化碳中毒

C.阿托品中毒 D.氰化物中毒

E.酒精中毒

【答案】B

9.关于急性蜂窝织炎的描述不正确的是

- A.致病菌主要是化脓性链球菌
- B.病变区与正常皮肤无明显界线
- C.局部明显红肿剧痛
- D.可由软组织损伤后感染引起
- E.多伴有寒战、高热等全身症状

【答案】A

10.引起疖、痈的常见致病菌是

- A.金黄色葡萄球菌
- B.化脓性链球菌 A 群
- C.大肠埃希菌
- D.铜绿假单胞菌
- E.脆弱拟杆菌

【答案】A

11.软组织急性化脓性感染,在出现波动前,需早期切开引流的是

- A.转移性脓肿
- B.脓性指头炎
- C.面部疖肿
- D.急性蜂窝织炎
- E.痈

【答案】B

12.慢性阻塞性肺疾病主要引起

- A.左心衰竭
- B.心肌炎
- C. I 型呼吸衰竭
- D.心包炎
- E. II 型呼吸衰竭

【答案】E

13.有机磷农药急性中毒,瞳孔变化是

- A.可略缩小
- B.明显缩小
- C.大小不等
- D.扩大

E.无变化

【答案】B

14.有机磷中毒时,下列哪一项不符合毒蕈碱样表现

A.肌力减弱

B.呕吐、腹痛、腹泻

C.瞳孔针尖样缩小

D.心率减慢

E.多汗

【答案】A

15.一氧化碳中毒时,最佳的治疗方法是

A.脱水剂

B.高热营养

C.大量维生素

D.抗生素

E.高压氧治疗

【答案】E

16.高温环境下预防中暑,下列哪项不正确

A.保持室内通风

B.避免强烈日光长时间直射人体

C.减少室外剧烈运动

D.穿紧身绝缘服装

E.多饮含盐饮料

【答案】D

17.患者,男性,36岁,患血友病,在输血过程中出现头部胀痛、四肢麻木、腰背部剧痛、黄疸、血压下降等症状。病人尿液中可含有

A.淋巴细胞

B.血红蛋白

C.胆红素

D.红细胞

E.大量白细胞

【答案】B

18. 该患者若发生了室颤, 护士采取的处理措施正确的是

- A. 同步直流电除颤
- B. 非同步直流电除颤
- C. 心内注射利多卡因
- D. 立即肌注阿托品
- E. 立即给予患者心脏按压

【答案】B

19. 胎盘从母体面有哪几层构成

- A. 底蜕膜、叶状绒毛膜、羊膜
- B. 羊膜、平滑绒毛膜、底蜕膜
- C. 胎膜、羊膜、底蜕膜
- D. 羊膜、壁蜕膜、底蜕膜
- E. 羊膜、叶状绒毛膜、胎膜

【答案】A

20. 下列关于临产的说法正确的是

- A. 有规律而逐渐增强的宫缩, 宫颈管消失, 宫口扩张, 胎先露下降
- B. 无宫缩, 少量阴道流血, 宫颈管消失, 宫口扩张, 胎先露下降
- C. 不规律宫缩, 少量阴道流血, 宫颈管消失, 宫口扩张, 胎先露下降
- D. 不规律宫缩, 宫颈管消失, 宫口扩张, 胎先露下降
- E. 每 10~15 分钟一次宫缩, 宫颈管消失, 宫口扩张, 胎先露下降

【答案】A

21. 先兆早产的最主要治疗是

- A. 控制感染
- B. 抑制宫缩
- C. 左侧卧位休息
- D. 做好清宫准备
- E. 安慰孕妇

【答案】B

22. 异位妊娠患者首要的护理措施是

- A. 观察阴道流血情况
- B. 观察腹痛加剧情况
- C. 遵医嘱建立静脉通路
- D. 遵医嘱给予抗炎治疗
- E. 遵医嘱给予氧气吸入

【答案】C

23. 对于妊娠合并心脏病患者产进行褥期护理不妥的是

- A. 凡属不宜在妊娠者,应在产后 3 天实施绝育术
- B. 产后应继续使用抗生素 1 周左右,预防感染
- C. 产后 1 周内仍然有发生心力衰竭的可能
- D. 有过心衰史的患者,产后仍需要继续使用强心剂
- E. 心功能Ⅲ级以上的不宜哺乳

【答案】A

24. 胎盘滞留的是指胎儿娩出后多长时间胎盘尚未娩出

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 30 分钟
- D. 40 分钟
- E. 50 分钟

【答案】C

25. 慢性宫颈炎患者的主要症状是

- A. 外阴皮肤瘙痒
- B. 阴道分泌物稀薄
- C. 白带多
- D. 泡沫样白带
- E. 腹痛

【答案】C

26. 人工流产手术过程中,患者出现腹痛、出冷汗及血压下降等
症状,其产生的原因可能是

- A. 人工流产综合征
- B. 子宫穿孔
- C. 出血性休克
- D. 手术操作粗暴

E.脏器损伤

【答案】A

27.女,30岁。平素月经规律,周期为35天,末次月经为2018年5月20日。其排卵期大约为

A.6月1日

B.6月6日

C.6月10日

D.6月15日

E.6月20日

【答案】C

28.女,29岁。第二胎,孕39⁺³周,行剖宫产分娩一男婴。下列关于产褥期体内激素说法正确的是

A.高雌激素、高孕激素

B.高雌激素、低泌乳激素

C.低雌激素、高泌乳激素

D.低雌激素、高孕激素

E.高孕激素、低泌乳激素

【答案】C

29.李某某,女,34岁。妊娠16周,此时发生流产,先出现的临床症状是

A.阴道流血

B.腹痛

C.胎儿排出

D.胎盘排出

E.失血性休克

【答案】B

30.女,26岁。孕36周,近一周以来水肿加重并伴有视物模糊,头晕、头痛;查体:BP170/110 mmHg,水肿(++),尿蛋白5.5 g/L。今日上午患者突然出现剧烈腹痛,伴有少量阴道流血,护士首先应考虑出现

A.早产

B.临产

- C.前置胎盘
D.胎盘早剥
E.子宫破裂

【答案】D

31.女,30岁。孕32周,以往有过2次人工流产史,突然出现大量阴道流血,超过月经量。检查:血压100/70 mmHg,腹软,无压痛,头先露,先露高浮,胎心良好。按急诊剖宫产收治入院,护士首先应作的是

- A.办理入院手续
B.准备沐浴
C.检查阴道出血情况
D.介绍医院规章制度
E.用平车送入病区

【答案】E

32.李女士,42岁。已婚,白带增多半年,近来出现性交后出血,妇科检查示重度宫颈糜烂,附件未见异常。患者询问护士筛查早期宫颈癌最常用的方法是

- A.阴道窥器检查
B.阴道镜检查
C.宫腔镜检查
D.宫颈刮片细胞学检查
E.宫颈活体组织检查

【答案】D

33.隋女士,35岁,葡萄胎清宫术后5个月出现阴道流血,医生建议进行病理检查。其中葡萄胎与侵蚀性葡萄胎的鉴别是

- A.HCG的测定
B.有无黄素化囊肿
C.有无肌层浸润
D.子宫增大速度
E.有无绒毛结构

【答案】C

34.上部量等于下部量的年龄是

- A.5 岁
B.7 岁
C.10 岁
D.12 岁
E.15 岁

【答案】D

35.ORS(口服补液盐)液的成分中电解质含量最多的是

- A.氯化钠
B.氯化钾
C.氯化钙
D.葡萄糖
E.碳酸氢钠

【答案】A

36.下列不是异烟肼预防性服药防止活动性肺结核发生的指征是

- A.接触肺结核者
B.3 岁以下婴幼儿未接种卡介苗而 PPD 阳性者
C.PPD 新近由阴性转为阳性
D.PPD 阳性,新患百日咳小儿
E.PPD 阳性伴结核中毒症状者

【答案】A

37.急性坏死性小肠结肠炎的主要病变部位为

- A.回肠
B.空肠
C.直肠
D.盲肠
E.结肠

【答案】B

38.关于 4 : 3 : 2 液的组成说法正确的是

- A.4 份生理盐水,3 份 10%葡萄糖,2 份 1.4%碳酸氢钠
B.4 份生理盐水,3 份 10%葡萄糖,2 份 2.5%碳酸氢钠

- C.4 份生理盐水,3 份 5%葡萄糖,2 份 5%碳酸氢钠
- D.4 份 5%葡萄糖,3 份生理盐水,2 份 5%碳酸氢钠
- E.4 份 10%葡萄糖,3 份 11.2%乳酸钠,2 份生理盐水

【答案】A

39.关于室间隔缺损的叙述,正确的是

- A.X 线显示右心室、左心室,甚至左心房增大
- B.X 线显示肺动脉段突出,主动脉弓增大
- C.X 线显示肺门影增浓,肺野清晰,无肺门舞蹈征
- D.肺动脉瓣第二心音亢进,伴有固定性分裂
- E.胸骨左缘有响亮粗糙的机械性杂音

【答案】A

40.下列关于小儿泌尿道感染易感因素的说法中错误的是

- A.泌尿道感染发生率男孩大于女孩
- B.男孩由于包皮过长,包茎积垢,易引起上行感染
- C.小儿输尿管管壁肌肉及弹力纤维发育不全易于发生尿滞留
- D.IgA 抗体生成不足使细菌易于侵入
- E.使用糖皮质激素增加感染的几率

【答案】A

41.脑性瘫痪最常见的中枢瘫痪类型是

- A.痉挛型
- B.手足徐动型
- C.肌张力低下型
- D.强直型
- E.共济失调型

【答案】A

42.足月婴儿各种补体成分浓度达到成人水平的年龄是

- A.1~2 个月
- B.2~3 个月

- C.3~4 个月
D.3~6 个月
E.6~9 个月

【答案】D

43.新生儿颅内出血,首选助诊方法

- A.血常规
B.侧脑室穿刺
C.头颅 CT
D.腰椎穿刺
E.硬脑膜穿刺

【答案】C

44.新生儿缺血缺氧性脑病,惊厥发作时首选的药物是

- A.苯巴比妥钠
B.地西泮
C.苯妥英钠
D.5%水合氯醛
E.丙戊酸钠

【答案】A

45.一健康男婴,8个月。今日上午接种麻疹减毒活疫苗,当晚,接种部位局部出现直径约 1.5 cm 的红色硬结,体温 38.8℃,并伴有恶心、呕吐、腹泻等全身不适反应。此时正确的护理措施是

- A.局部热敷
B.休息饮水,必要时入院治疗
C.观察不必处理
D.注射肾上腺素 0.5~1 mL
E.服用扑尔敏

【答案】B

46.某小儿三岁,腹泻 6 天,近日有惊厥抽搐表现,进行补钙治疗后症状仍不好转,应考虑该患儿并发了

- A.低钾血症
B.高钾血症
C.低镁血症
D.代谢酸中毒
E.代谢性碱中毒

【答案】C

47. 患女, 1 岁半, 出生后即发现心脏有杂音, 婴儿期喂养困难, 经常咳嗽, 患过 3 次肺炎。查体: 消瘦, 心前区隆起, 心界向左下扩大, 胸骨左缘第 3~4 肋间有 IV 级粗糙收缩期杂音, P_2 增强, 应考虑

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联征
- E. 肺动脉狭窄

【答案】B

48. 8 岁患儿, 女, 1 周来有反复尿频、尿急、尿痛, 清洁段尿培养为大肠埃希菌生长, 尿内菌落数 $> 10^5$ /mL, 对于该小儿的护理措施错误的是

- A. 鼓励患儿多饮水, 多排尿
- B. 给予足够热量, 丰富的蛋白质和维生素
- C. 酸化尿液
- D. 便后冲洗外阴
- E. 常规清洁消毒外阴后取中段尿标本

【答案】C

49. 患儿男, 10 个月, 因高热 7 天伴发皮疹 2 次来院。查: 发育营养好, 皮肤可见红色斑丘疹, 呈向心性、多形性, 左颈部淋巴结 1.5×2 cm, 心脏听诊杂音, 咽红, 杨梅舌, 肺清, 腹软, 肝脾不大, 四肢末端红肿。实验室检查: Hb 100 g/L, WBC 12×10^9 /L, 血沉 65 mm/h, 最可能的诊断是

- A. 风湿性心脏病
- B. 过敏性紫癜
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 颈淋巴结炎
- E. 川崎病

【答案】E

50. 患儿, 1 岁。诊断为金黄色葡萄球菌肺炎, 今晨突然发现患儿出现呼吸困难, 给予吸痰和吸氧后, 呼吸困难症状无明显缓解, 应考虑患儿出现了哪种情况

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 合并心力衰竭
- C. 高热所致
- D. 并发脓气胸
- E. 肺部炎症加重

【答案】D